







Attraktive Wildpflanzen




Dies ist eine Auswahl von zwei- bis mehrjährigen Arten, die gemäss Grüner Liste für die **biogeographischen Regionen 1–5** (wo die meisten Städte und Agglomerationen liegen) empfohlen werden; geordnet nach wissenschaftlichen Namen. Legende: WH = Wuchshöhe in cm; BM = Blühmonat; LB = Lichtbedarf: ○ = sonnig, ⊙ = halbschattig, ● = schattig; WB = Wasserbedarf: ♡ = trocken, ♡♡ = mässig trocken bis mässig feucht, ♡♡♡ = nass; NB = Nährstoffbedarf: □ = nährstoffarm, ◻ = mässige Nährstoffe, ■ = nährstoffreich; * = braucht sauren Boden; Wert für Tiere (nicht vollständig): 🦋 = Tag- & Nachtfalter; 🐝 = andere Insekten; 🐦 = Vögel; LR = Lebensräume: Ks = Krautsaum, Rf = Ruderalflur, Tu = Teich, TM = Trockenmauer, W = Wiese, Wh = Wildhecke; NG = Nahrungsgrundlage für mindestens diese Arten; BS = Besonderheiten; A = Arten

Art	WH BM	LB WB NBe	LR NG BS
 Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> CFö	20–80 6–9	○ ♡♡ ◻	Ks, Rf, W 🦋 23 A Ausläufer
 Feld-Steinquendel <i>Acinos arvensis</i> CDu	10–40 6–9	○ ♡ □	Rf, W
 Kleiner Odermennig <i>Agrimonia eupatoria</i> MRe	30–100 6–9	○ ♡♡ ◻	Ks, W 🐝
 Genfer Günsel <i>Ajuga genevensis</i> RDe	10–30 4–6	⊙ ♡♡ ◻	W
 Wiesen-Kerbel <i>Anthriscus sylvestris</i> RDe	50–150 4–8	⊙ ♡♡ ■	Ks, Rf, W
 Gemeine Akelei <i>Aquilegia vulgaris</i> RDe	30–90 5–7	⊙ ♡♡ ◻	Ks 🐦 giftig
 Gemeiner Beifuss <i>Artemisia vulgaris</i> CAn	50–150 7–9	○ ♡♡ ■	Ks, Ru 🐝 12 A 🦋 45 A Heilpflanze
 Süsser Tragant <i>Astragalus glycyphyllos</i> CAn	30–120 6–8	⊙ ♡♡ ◻	Kr, Wh 🐝 53 A 🦋 10 A Futterpflanze
 Fieder-Zwenke <i>Brachypodium pinnatum</i> RDe	50–120 6–8	⊙ ♡♡ ◻	W
 Mittleres Zittergras <i>Briza media</i> RDe	20–50 5–8	○ ♡♡ □	W
 Aufrechte Trespe <i>Bromus erectus</i> STS	30–100 5–6	○ ♡♡ □	Ks, W
 Sumpf-Dotterblume <i>Caltha palustris</i> MRe	–50 3–5	⊙ ♡♡ ◻	Tu, W
 Knäuelblütige Glockenblume <i>Campanula glomerata</i> RDe	15–60 6–8	○ ♡♡ □	W 🐦
 Wiesen-Glockenblume <i>Campanula patula</i> SBl	30–90 6–8	○ ♡♡ ◻	W 🐦
 Pfirsichblättrige Glockenblume <i>Campanula persicifolia</i> SBl	40–100 6–7	⊙ ♡♡ □	Ks 🐦
 Acker-Glockenblume <i>Campanula rapunculoides</i> CDu	30–70 6–9	⊙ ♡♡ ◻	Ks, Rf 🐦 Ausläufer

	Art	WH BM	LB WB NBe	LR NG BS		Art	WH BM	LB WB NBe	LR NG BS
	Rapunzel-Glockenblume <i>Campanula rapunculus</i>	30–90 5–7	☉ ●● ■	Ks, W 🐛		Wirbeldost <i>Clinopodium vulgare</i>	20–60 7–9	☉ ●● □	Ks 🐛 3 A 🐛 Ausläufer
	Rundblättrige Glockenblume <i>Campanula rotundifolia</i>	10–40 5–9	○ ●● □	W, TM 🐛 38 A 🐛 20 A		Maiglöckchen <i>Convallaria majalis</i>	10–25 5	☉ ●● □	🐛 giftig
	Nesselblättrige Glockenblume <i>Campanula trachelium</i>	40–100 7–9	●●● ●●● ■	Ks 🐛		Hohlknolliger Lerchensporn <i>Corydalis cava</i>	15–30 3–4	☉ ●●● ■	Ks, Wh 🐛 2 A Frühblüher giftig
	Wiesen-Schaumkraut <i>Cardamine pratensis</i>	15–60 4–5	☉ ●●●—●●● ■	W 🐛, 🐛 z. B. Zikaden		Wilde Möhre <i>Daucus carota</i>	30–100 6–8	○ ●● □	Rf, W 🐛 46 A 🐛 Nahrung
	Schlaffe Segge <i>Carex flacca</i>	20–80 4–6	☉ ●—●●● □	W		Kartäuser-Nelke <i>Dianthus carthusianorum</i>	20–50 6–10	○ ● □	W 🐛 16 A
	Hänge-Segge <i>Carex pendula</i>	50–150 6	●●●—●●● ■	Tu		Wilde Karde <i>Dipsacus fullonum</i>	50–200 7–8	○ ●●●—●●● ■	Ks, Rf 🐛 3 A 🐛, 🐛
	Gewöhnliche Golddistel <i>Carlina vulgaris</i>	10–30 7–9	○ ●—● ■	W		Gemeiner Natterkopf <i>Echium vulgare</i>	30–100 5–10	○ ●● ■	Rf 🐛 49 A 🐛, 🐛
	Wiesen-Flockenblume <i>Centaurea jacea</i>	10–60 6–9	○ ●● ■	W 🐛 44 A 🐛, 🐛		Wald-Weidenröschen <i>Epilobium angustifolium</i>	30–100 6–8	☉ ●● ■	Ks 🐛, 🐛
	Berg-Flockenblume <i>Centaurea montana</i>	20–60 5–8	☉ ●● ■	W, Kr 🐛 84 A 🐛 30 A		Zottiges Weidenröschen <i>Epilobium hirsutum</i>	50–150 6–9	☉ ●●●—●●● ■	Ks
	Skabiosen-Flockenblume <i>Centaurea scabiosa</i>	30–120 6–8	○ ●● □	W		Wasserdost <i>Eupatorium cannabinum</i>	50–150 7–9	☉ ●●●—●●● ■	Ks, Tu 🐛 45 A 🐛 giftig
	Schöllkraut <i>Chelidonium majus</i>	30–80 4–9	☉ ●● ■	Kr, TM 🐛, 🐛 Heilpflanze		Zypressenblättrige Wolfsmilch <i>Euphorbia cyparissias</i>	15–50 4–6	☉ ●● □	W giftig
	Wegwarte <i>Cichorium intybus</i>	20–120 7–9	○ ●● ■	Rf 🐛 Weisslinge, 🐛, 🐛		Moor-Geissbart <i>Filipendula ulmaria</i>	50–200 6–8	☉ ●●●—●●● ■	Tu, W 🐛 3 A 🐛

	Art	WH BM	LB WB NBe	LR NG BS		Art	WH BM	LB WB NBe	LR NG BS
	Echtes Labkraut <i>Galium verum</i>	10–70 6–9	○ ●●● □	Ks, W 9 A Ausläufer		Feld-Hainsimse <i>Luzula campestris</i>	5–20 3–5	○ ●● □	W Ausläufer
	Blutroter Storchschnabel <i>Geranium sanguineum</i>	30–50 5–7	◎ ●●● □	Ks Boden-decker		Gemeiner Gilbweiderich <i>Lysimachia vulgaris</i>	40–130 6–8	◎ ●●●● □ / *	Tu
	Bach-Nelkenwurz <i>Geum rivale</i>	30–60 4–7	◎ ●●●● ■	W		Blut-Weiderich <i>Lythrum salicaria</i>	30–120 7–8	◎ ●●●● □	Tu 21 A
	Sonnenröschen <i>Helianthemum nummularium</i>	10–40 5–10	○ ●● □	W		Sigmarwurz <i>Malva alcea</i>	50–100 7–9	○ ●● ■	Rf
	Leberblümchen <i>Hepatica nobilis</i>	5–15 3–5	● ●● □	Ks Frühblüher giftig		Bisam-Malve <i>Malva moschata</i>	50–60 6–9	○ ●● □	Rf, W
	Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i>	30–100 6–9	◎ ●●●● □	Ks, Rf, W		Wilde Malve <i>Malva sylvestris</i>	30–120 6–9	○ ●● ■	Rf
	Dürrwurz-Alant <i>Inula conyzae</i>	50–100 7–10	◎ ●● □	Ks z. B. Löcherbiene		Nickendes Perlgras <i>Melica nutans</i>	25–50 5–6	● ●● □	Ks
	Gelbe Schwertlilie <i>Iris pseudacorus</i>	50–100 6	◎ ●●●● ■	Tu giftig		Weisser Honigklee <i>Melilotus albus</i>	30–150 6–8	○ ●● □	Rf 5 A
	Feld-Witwenblume <i>Knautia arvensis</i>	30–100 5–9	○ ●● □	W 34 A		Echter Honigklee <i>Melilotus officinalis</i>	30–150 6–10	○ ●●●● □	Rf 5 A
	Wald-Witwenblume <i>Knautia dipsacifolia</i>	20–100 6–9	◎ ●●● □	Ks, W		Wasser-Minze <i>Mentha aquatica</i>	20–50 7–10	◎ ●●●● □	Tu 7 A Ausläufer
	Wiesen-Margerite <i>Leucanthemum vulgare</i>	10–80 5–10	○ ●● □	Rf, W 13 A Käfer		Acker-Minze <i>Mentha arvensis</i>	20–50 7–9	◎ ●●●● ■ *	Rf Ausläufer
	Gemeines Leinkraut <i>Linaria vulgaris</i>	20–70 6–9	○ ●● ■	Rf		Ross-Minze <i>Mentha longifolia</i>	30–100 7–9	◎ ●●●● ■	Tu, W; Ausläufer

	Art	WH BM	LB WB NBe	LR NG BS
	Sumpf-Ver-gissmeinnicht <i>Myosotis scorpioides</i>	15–50 5–7	☉ ●●●—●● ■	Tu
	Kriechende Hauhechel <i>Ononis repens</i>	30–60 6–9	○ ●● □	W
	Dornige Hauhechel <i>Ononis spinosa</i>	30–60 6–9	○ ●●—● □	W ● 3 A Dornen
	Echter Dost <i>Origanum vulgare</i>	20–60 7–9	☉ ●● ■	Ks, W ● 62 A
	Pastinak <i>Pastinaca sativa</i>	30–100 7–8	○ ●● ■	Rf, W
	Schlangen-Knöterich <i>Polygonum bistorta</i>	30–80 5–7	☉ ●●● ■	W
	Frühlings-Fingerkraut <i>Potentilla verna</i>	5–30 4–5	○ ● □	W, Tm Boden-decker
	Wald-Schlüssel-blume <i>Primula elatior</i>	10–25 3–5	●● ●●● ■	Ks, W ● 7 A Früh-blüher
	Frühlings-Schlüssel-blume <i>Primula veris</i>	10–30 4–5	○ ●—●●● □	W ● 2 A Früh-blüher
	Gelbe Reseda <i>Reseda lutea</i>	25–60 6–9	○ ●● ■	Rf Masken-bienen
	Klebrige Salbei <i>Salvia glutinosa</i>	40–100 7–9	●●● ●●●—●● ■	Ks ● 10 A Hum-meln
	Wiesen-Salbei <i>Salvia pratensis</i>	30–60 5–8	○ ●● □	W

	Art	WH BM	LB WB NBe	LR NG BS
	Echtes Seifenkraut <i>Saponaria officinalis</i>	30–70 7–9	☉ ●● ■	Ks, Rf ● 9 A Aus-läuer
	Tauben-Skabiose <i>Scabiosa columbaria</i>	20–80 6–9	○ ●● □	W ● 34 A
	Bunte Kronwicke <i>Securigera varia</i>	30–120 6–8	☉ ●● □	Ks, W ● 20 A giftig
	Weisser Mauerpfeffer <i>Sedum album</i>	8–20 6–9	○ ●—●● □	Tm ● 14 A Boden-decker
	Felsen-Mauerpfeffer <i>Sedum rupestre</i>	5–30 7–9	○ ●—●● □	W, Tm
	Riesen-Fettkraut <i>Sedum telephium</i>	20–70 6–9	○ ●●—● ■	Ks, Tm ●, ●, ●
	Rote Waldnelke <i>Silene dioica</i>	30–90 4–9	☉ ●●●—●● ■	Ks ● 10 A Haut-flügler
	Kuckucks-Lichtnelke <i>Silene flos-cuculi</i>	30–90 5–8	○ ●●●—●● ■	Tu ● 6 A Zikaden
	Nickendes Leimkraut <i>Silene nutans</i>	25–60 6–7	☉ ●● □	Ks, W
	Klatschnelke <i>Silene vulgaris</i>	30–50 6–9	○ ●● □	Rf, W
	Echte Betonie <i>Stachys officinalis</i>	20–70 7–9	○ ●—●●● ■	Ks, W ● 2 A
	Aufrechter Ziest <i>Stachys recta</i>	20–60 6–10	○ ● □	W z. B. Schlürf-bienen

	Art	WH BM	LB WB NBe	LR NG BS
 CDu	Echte Wallwurz <i>Symphytum officinale</i>	40–120 5–8	☉ ●●●●● ■	Ks, Tu ♣ z. B. Erd- & Garten- hummel
 MRe	Rainfarn <i>Tanacetum vulgare</i>	40–120 6–9	○ ●●●●● ■	Rf ♣ 7 A ♣ 9 A giftig
 SBl	Edel- Gamander <i>Teucrium chamaedrys</i>	10–25 6–8	☉ ●●● □	Ks, W Aus- läufer
 AMa	Akelei- blättrige Wiesenraute <i>Thalictrum aquilegifolium</i>	40–140 5–7	☉ ●●●●● ■	Ks
 MRe	Arznei-Feld- Thymian <i>Thymus pulegioides</i>	8–25 4–8	○ ●●● □	W ♣ 8 A
 RDe	Grosser Bocksbart <i>Tragopogon dubius</i>	30–70 5–6	○ ● ■	Rf
 CDu	Grosse Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	70–120 6–9	☉ ●●●●● ■	Ks, Rf ♣ 50 A ♣, ♣
 CDu	Arznei- Baldrian <i>Valeriana officinalis</i>	60–160 5–8	☉ ●●●●● ■	Tu ♣ 5 A ♣
 RDe	Grossblütige Königskerze <i>Verbascum densiflorum</i>	30–150 6–9	○ ●● ■	Rf ♣ 2 A
 RDe	Lampen-Kö- nigskerze <i>Verbascum lychnitis</i>	50–150 6–9	○ ●● ■	Ks, Rf
 RDe	Dunkle Königskerze <i>Verbascum nigrum</i>	30–100 6–8	○ ●● ■	Ks, Rf ♣ 2 A
 KRe	Wohl- riechendes Veilchen <i>Viola odorata</i>	5–15 3–4	☉ ●● ■	Ks ♣ 6 A Früh- blüher

